Pragas da Alface

* Pragas Chaves:

Tripes:

Característica: Ciclo biológico - Ovo, Larva, Pupa e Adulto - 12 a 25 dias.

Danos: Adultos e Larvas perfuram os Tecidos e sugam o conteúdo. A região atacada apresenta manchas e coloração diferente.

Pulgões:

Característica: Ciclo biológico - Ninfa e Adulto - 5 a 15 dias

Danos: Adultos e Ninfas sugam a seiva e injetam nas plantas provocando a Transmissão de vírus.

* Pragas Secundárias:

Formigas - Cortadeiras:

Característica: Ciclo biológico - Ovo, Larva, Pupa e Adulto - 60 dias.

Danos: Durante a noite elas cortam as folhas da alface, pode ocorrer infestação severa tendo que replantar a muda.

Grilo:

Característica: Ciclo biológico - Ovo, Ninfa e Adulto - 90 dias.

Danos: Adultos e Ninfas atacam as raízes, provovendo o corte da muda e planta, acarretando a morte da alface.

Paquinha:

Característica: Ciclo biológico - Ovo, ninfa e adulto - 110 a 300 dias

Danos: Adultos e ninfas causam danos diretos à planta, durante a noite elas atacam caules e folhas da planta, perto do solo, causando sua morte.

Lagarta - militar:

Característica: Ciclo biológico - Ovo, larva, pupa e adulto - 24 a 26 dias.

Danos: As lagartas atacam as folhas, em varias fases, causam per. furações nas folhas, podendo evoluir para desfolha ou total da planta.

Lagarta - rosca:

Característica: Ciclo biologico - ovo, larva, pupa e adulto - 34 a 64 dias

Danos: As lagartas promovem o corte da planta, acarretando sua morte

Lagarta - falsa-medideira:

Característica: Ciclo biológico - Ovo, larva, pupa e adulto - 21 a 40 dias

Danos: As lagartas causam perfurações nas folhas, podendo evoluir para desfolha ou total da especie.

Moscas - minadoras:

Característica: Ciclo biológico - Ovo, larva, pupa e adulto - 14 a 30 dias.

Danos: As larvas abrem galerias translúcidas ou esbranquiçadas estreitas e irregulares, em forma de serpentina nas folhas.

Vaquinha:

Característica: Ciclo biológico - Ovo, larva, pupa e adulto - 30 a 60 dias

Danos: A larva ataca as raízes da planta e se alimentam das folhas, causando perfurações

Moscas-brancas:

Características: Ciclo biológico - ovo, ninfa e adulto - 14 a 27 dias

Danos: Ataca as plantas no viveiro de mudas ou sementeira e no cultivo após o transplantio, principalmente nas folhas jovens.

Traça-das-crucíferas:

Características: Ciclo biológico: ovo, lagarta, pupa e adulto - 11 a 28 dias.

Danos: As lagartas causam perfurações e desfolha.

Curuquerê-da-couve:

Características: Ciclo biológico - ovo, larva, pupa e adulto - 26 a 42 dias

Danos: As lagartas causam desfolha.

Lagarta Helicoverpa:

Características: Ciclo biológico - ovo, larva, pupa e adulto - 35 a 45 dias.

Danos: As lagartas causam desfolha.

Fungus gnats:

Características: Ciclo biológico - ovo, larva, pupa e adulto - 20 a 36 dias

Danos: Além de fungos, as larvas se alimentam das raízes e radicelas e podem broquear o caule das mudas no viveiro ou na sementeira.

Lesmas e Caracóis:

Características: Ciclo biológico - ovo, imaturo e adulto - até 6 meses.

Danos: Adultos e imaturos alimentam-se raspando as folhas da alface. As folhas atacadas apresentam perfurações irregulares.